

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP -4-7-72 416233

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67-084 - STRASBOURG CEDEX
Tél. 34-14-63 - Poste 93

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F
Régisseur de recettes D.D.A.
2, Rue des Mineurs
67-070 - STRASBOURG - CEDEX

Bulletin n° 142 du mois de Juillet 1972

3 Juillet 1972

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Des sorties très importantes de papillons ont été notées dans nos élevages au cours des journées chaudes que nous avons connues les 25, 26 et 27 Juin.

Nous venons d'enregistrer la période de plus forte activité des papillons de cette première génération. De nouvelles pontes sont déposées et les éclosions de jeunes chenilles auront lieu au cours de cette semaine.

Un deuxième traitement sera à effectuer avant le 7 Juillet.

PUCERONS

Des colonies de Pucerons cendrés s'installent très rapidement dans de nombreux vergers. Il n'est pas rare de les observer sur les fruits, ce qui est tout à fait exceptionnel.

Si nécessaire, ajouter un produit aphicide spécifique à la bouillie destinée à lutter contre le Carpocapse. Les spécialités mixtes sont souvent insuffisantes pour détruire efficacement les Pucerons cendrés.

OIDIUM

Dans les vergers contaminés, poursuivre la lutte contre cette maladie.

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

ANTHRACNOSE DU CERISIER

Après la récolte, renouveler le traitement contre l'Anthracnose du cerisier. Ajouter à la bouillie, un produit destiné à lutter contre les Pucerons noirs, très abondants cette année.

En pépinière, ce traitement devra être effectué dans les meilleurs délais.

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE

DORYPHORE

Les pontes déposées à la face inférieure des feuilles de pommes de terre, à partir du 20 Juin, viennent d'éclore dans leur majorité. Les jeunes larves qui se développent rapidement, peuvent être observées dans de nombreuses parcelles. Intervenir sans attendre, avec l'un des produits figurant sur la liste des pesticides en votre possession.

Certains échecs proviennent d'une mauvaise répartition de la bouillie sur les cultures. Traiter avec soin l'ensemble des pieds (les produits recommandés agissent essentiellement par ingestion). En cas d'utilisation d'appareils à volume réduit, avoir soin d'apporter la quantité de matière active préconisée à l'hectare (sur la base de 1.000 litres d'eau/ha).

Rappelons que la lutte contre le Doryphore est obligatoire.

.../...

MILDIOU

Les premières taches de Mildiou vont apparaître très prochainement. Nous conseillons de profiter de l'intervention contre le Doryphore, pour réaliser un traitement mixte (fongicide + insecticide).

BETTERAVES INDUSTRIELLES

PUCERONS

Comme sur bien d'autres cultures, les colonies de Pucerons noirs s'installent rapidement sur betteraves.

Il appartient aux betteraviers, de suivre très attentivement le développement de ces colonies et de prendre d'eux-mêmes, la décision de l'intervention chimique.

Les Coccinelles (auxiliaires précieux pour lutter contre les Pucerons) sont très nombreuses cette année. En cas de développement lent des Pucerons, elles seront suffisantes pour maintenir les colonies au-dessous du seuil de nuisibilité.

COLZA DE PRINTEMPS

CHARANCONS DES SILIQUES

Depuis quelques jours, de fortes captures de Charançons des siliques sont signalées en LORRAINE. Dans les cultures de colza de printemps encore en floraison, un traitement insecticide en bordure, pourrait être envisagé. Choisir un produit reconnu non dangereux pour les abeilles (voir notre Note du 4 Mai 1972).

HOUBLON

MILDIOU

Les houblons arrivent à un stade de grande sensibilité à la maladie (pré-floraison à début floraison). Renouveler le traitement en fin de semaine.

PUCERONS

Dans les houblonnières non protégées par le Diméfox, ne pas attendre de voir des infestations massives de Pucerons pour traiter. Dans ce cas, aucun traitement ne permettra d'obtenir l'efficacité recherchée.

Nous rappelons que la quantité de bouillie à mettre en oeuvre à l'hectare, doit être suffisante et les quantités de produit à utiliser y correspondre.

CULTURES MARAICHÈRES

PUCERONS

Surveiller le développement des Pucerons sur toutes cultures, notamment : haricots, betteraves rouges, choux, tomates, carottes...

Si un traitement s'avère nécessaire, choisir de préférence, un aphicide spécifique, en tenant compte du délai d'emploi des pesticides, pour le traitement sur pied des végétaux dont la récolte est consommable (consulter le Bulletin n° 140 du mois de Mai).

Nous rappelons une nouvelle fois, que le Méta-systémox R, le Dimécron 10, le Kilval, le Systamac 400 et le Vamifène, sont interdits sur toutes cultures légumières, y compris les fraisiers.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 3 au Bulletin n° 141 publié le 23 Juin 1972.